

子宮頸がんワクチンを接種された方、保護者さまへ (HPV ワクチン)

ワクチンを受けた後は、体調に変化がないか
十分に注意してください。

接種当日

- 接種後 30 分ほどは安静にし様子をみましょう
※緊張や痛みをきっかけに、立ちくらみがしたり、気を失うことがあります。通常、横になって休めば自然に回復します。
- 今日は激しい運動は避けてください

数週間後まで

気になる症状が出たときはすぐに医師に相談してください。当院以外を受診する場合はワクチン接種したことを医師に伝えてください。

ワクチン接種後の副反応

接種後に現れる可能性のある症状

疼痛*、腫れ*、赤み*、頭痛、浮動性めまい、悪心、下痢、かゆみ*、発熱、疲労、内出血* など
* ワクチンを接種した部位の症状

まれに起こりうる重い症状

呼吸困難、じんましんなど重いアレルギー、手足の力が入りにくい、頭痛、嘔吐、意識の低下など

くわしくは厚労省 HP へ

Q&A内「HPVワクチン接種後に副反応はありますか？」




厚労省 HPV

自分で日付を記入して忘れず接種！

接種スケジュールを確認しましょう

9 価ワクチン(シルガード® 9)は、決められた間隔をあけて、合計 3 回接種します

※1 回目または 2 回目に気になる症状が現れた場合は、2 回目以降の接種をやめることができます。



ワクチンを受けても、
子宮頸がん検診は必要です

ワクチンを受けた人も、20 歳をすぎたら 2 年に 1 回、必ず検診を受けてください。ワクチンで防げないタイプの HPV(ヒトパピローマウイルス)もあります。

Web予約とマイナ保険証でスムーズに接種できます！

診療時間	月	火	水	木	金	土
8:30~13:00	●	●	/	●	●	▲
14:00~17:00	●	●	/	●	●	▲

▲土曜診療…第1・2・4週
休診日：水曜、第3・第5土曜、日曜、祝日



nagi-mc.com



さっぽろ大通
内分泌クリニック

糖尿病内科 代謝内科 女性内科